

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書

重校竇氏圖註瘡瘍經驗全書序

余讀遼東詛載秦越人淳于髡俞跗
之徒其治人疾病皆能觀察體脉輒
洞臟腑決死生至不爽毫末如與齊
桓公魏太子所辨治多驗弗誣蓋其
伎神妙得之於心而又持其機權以
識其陰陽寒熱之辯經絡腸胃腠理

之殊而後施夫刀圭方藥若燭照而
數計者是以業是者未易及也然非
太史公為之記叙其何以聲施後世
而千載誦法之哉宋有竇漢卿者以
瘍醫行於慶曆祥符之間詔治太子
疾召入仁智殿下訊之未幾太子病
愈輒嘉勞之封為太師以國老稱遂

命製諸方以弘濟寰海外內一時神
其術者咸知有竇氏瘍醫矣然其書
之傳於世者分拆種種繪圖定方具
有法度信利人之妙術濟世之弘軌
也我

明以來家有傳焉其方多驗裔孫楠續
授太醫院醫士其子夢麟術業益工

聲稱籍甚乃緝遺書重增經驗諸方
梓以行世盖得其一技之良有功於
人庶幾繩祖父之萬一矣遡漢卿為
合肥人嘗遊江湖遇一至人而其術
益神則醫業之精信非偶然者矣夢
麟號仲泉今家常之無錫與華太學
復陽游復陽為秋官補菴公之子比

來京師備能道之欲乞一言為序余
知竇氏之醫如盧扁而深媿吾言之
不能如遷史令其信今而鳴後也聊
書以歸之

隆慶三年龍集己巳菊月望日

賜進士及第翰林院
國史脩撰分校
永樂大典纂修

世宗實錄兼理

詰勅

經筵講官吳郡申時行書

重校宋賢太師瘡瘍經驗全書卷一日

宋燕山

明三衢

咽喉說一

又說二篇

又說三篇

喉舌諸症或說

凡四十二篇

急喉圖說

單乳蛾圖說

風熱喉症圖說

牙癰圖說

舌微黃圖說

酒毒喉痺圖說

風毒喉痺圖說

風熱喉痺圖說

上腭生瘡圖說

又酒毒喉痺圖說

重舌症圖說

重腭症圖說

口瘡圖說

蓮花舌圖說

陰毒喉痺圖說

纏喉風外症說

積熱喉癰圖說

木舌症圖說

纏喉風內症說

虛牙圖說方一

牙宣圖說方五

啞瘡喉風圖說

弄舌喉風圖說方七

方七

喉腫圖說方一

喉節圖說方一

纏喉風圖說方一

方一

氣癰喉閉圖說方二

倉食喉風圖方二

喉癰圖說方一

脚根喉風圖說

喉閉圖說方一

喉瘤圖說方六

懸癰圖說方一

鎖喉瘡圖說方二

傷寒喉閉圖說方七

雙蛾風圖說方一

口緊圖說方一

木舌乳蛾圖說方一

第一卷目錄畢

瘡瘍經驗全書一卷

咽喉說一

朱寶漢卿撰集

呼者因陽出吸者隨陰入呼吸之間肺經主之喉嚨已下言六臟為手足之陰咽門已下言六腑為手足之陽蓋諸臟屬陰為裏諸腑屬陽為表以臟者藏也藏諸神流通也腑者府庫主出納水穀糟粕轉輸之謂也自喉嚨已下六臟喉應天氣乃肺之系也以肺屬金乾為天乾金也故天氣之道其中空長可以通氣息但喉嚨與咽並行其實兩異而人多惑之蓋喉嚨為息道咽中下水穀其喉下接肺之氣一云喉中三竅者非果喉中具

三竅則水穀與氣各從一竅而俱下肺中肺下無竅何
由傳送水穀入于下焦

黃帝書云肺為諸臟之華蓋藏真高之氣于肺經也故清
陽出上竅濁陰出下竅若世人不知保養風寒暑濕燥
六氣喜怒憂思悲恐驚之七情役冒非理百病生焉病
瘍既成須尋所自若喉痺乳蛾纏喉風喉瘡喉閉風毒
熱毒等症當刺則刺不可亂醫當吐則吐不可妄治此
等症係性命之根本生死立見不識其標本而攻之失
其法則禍不旋踵矣

又咽喉說二

○用溪云咽喉者一身總要與胃相授呼吸之所從出若
胞膈蘊積熱毒致生風痰壅滯不散發而為咽候之病
喉内生瘡或狀如肉赤肉為腫窒塞不通吐嚥不下甚
則生出重舌大法先去風痰以通咽膈然後解其熱毒
遲則有不救之患又有熱毒衝於上腭而生瘡謂之懸
癭及膈寒亦能令人咽閉吞吐不利宜用解法或曰
治法視火微甚微則正治甚則反治探痰出血隨所施
治或於手太指少商穴出血行氣衝達於外者必外敷
以藥予嘗以鷺翎蘸米醋繳喉中摘去痰涎蓋酸能收

痰又能消積血乳鷺而不散者以小刀就鷺上出血皆
用馬牙硝吹点咽喉以退火邪服射干青黛甘草桔梗
黃芩山梔大黃白礬牛旁子之類隨症佐利為方以散
上焦之熱外所付藥如生地伏龍肝非根皆可用若咽
喉生瘡或白或赤者多血大率多是痰熱先以桐油吐
之後用甘草湯解桐油之氣

咽喉論

咽喉一科首先大師公立論於前矣予豈敢復言乎獨
坐細思又不容已也咽喉之症司性命出納氣飲之所
深為至重然飲食精氣之要路肺與大腸表裏之別臟
腑上通咽喉下由大腸出入之門戶肺為華蓋發蔭五
臟死生之玄門也入穀則昌絕穀則亡朝生暮死暮生
朝死湏臾之間變症不一惟肺主金金主氣而生津液
灌溉一身流潤百骸金能生水生生不已循環無端順
則五臟華敷百關通暢此所謂養身之道也陽明燥金

以致火尅而生疾矣咽喉之症從熱而係乎太陽之標故推而治之可以解熱除毒祛風順氣則自然平金也丹溪先生以米醋攪口中以出痰酸以收之之義也愚見以為太酸則燥先用黃蘗汁加玄明粉少許灌喉中以吊其痰次用醋水仍前加玄明粉灌之后用蜜湯潤之漸漸探吐其痰則咽喉開利矣復以冰片散滋之無有不效若纏喉風用前三味不能探吐其痰宜用生桐油灌之驚翎撓之再用蜜湯潤之急服牛黃清心丸或豁痰丸以墜其痰旋以二陳湯加減服之無不愈者若

喉中聲出如雷噎食眼張天狂倒陷面黑唇焦鼻無氣
息目睛突出汗出如珠盧扁復出不能生矣然既患咽
喉口舌之蒞延及頸項頭面發腫紅如火光藥不能療
急用磁鋒砭去惡血用鷄子清調乳香末潤之立瘥再
用芭蕉根汁潤之以解其毒若口舌腫大紫黑急用針
點去血隨吹末藥甚効予久以此法行之頗活衆多故
以此理論而發明之再俟高明校裁勿罪迂謬幸甚

鈔山裔孫 夢麟識

新增一應咽喉口舌疳症神効方

目見此方則下藥者多致枉死有力之家
宜備各施人以積子孫

黃芩

生黃連

山梔仁

炒黑各煨
細末三不

青梅乾

煨存性

青黛

水飛去渣曬
干各五不

雄黃

雞內金各

人中白

五白朋砂

牛胆硝

各三不

枯白尾

三不

已上各為細末和勻加真射香

三分真冰片六分再碾和入小磁罐內以烏金紙緊塞罐口每用芦管超藥

吹入患上一日夜吹十余次徐流出痰涎漸愈如有腐臭急用蚌水灌淨或

用猪牙草隔栢子和搗加水去查灌淨前藥錢加半黃赤銅青熊胆珍珠各五

兒茶八分

製梅法大青梅

斤去核入白凡食鹽各五錢拌和再加麝香不拘多少層層間之
百多取每晒干收尽汁再晒于微灰存性臨用加入

製胆硝法冬月入朴硝在黑牛胆內掛在風處百日去皮用之

夏月宜用金箔其灌口用
上果工時一重之膏也三五

纏喉風訣

夫邪氣屬痰熱咽喉裏外皆腫者是也外面無腫者
必身發熱面赤以乃熱毒之氣極也外面有腫者身亦
發熱邪火發外之原也或牙關不強外面不腫但喉中
紅者曰暴感熱在心如左邊病退傳右邊此餘毒未盡
故也咽喉有數症有積熱有風熱有客熱有病後餘毒
未除變化如乳蛾者且如病中喉間有腫紅色數日其
光似鏡者此積熱也且如喉中有腫其色微白其形若
臂者此風毒喉痺也此熱毒因而感風相搏而發故也
或咽中有腫其色帶紫色者此乃客熱謂其人暴感熱

毒之氣壅塞喉間須用木通玄參生地黃芩黃連山梔
仁瀉心經之火為要或有傳變木舌者皆心熱蘊積於
膏中故口中痰臭服劑以涼膈為要搽藥以冰片散佐
之或用小靡刀点之以出紫血或風毒喉痺內外俱腫
其故何也風毒之氣結於喉間則壅塞喉間乃風毒與
痰相搏故也素問云無風則不動痰無痰則不受風風
痰相搏結塞咽喉其外症咽喉形如雞子大其色微白
外面腮上有腫其形似瘡身發寒熱牙關緊強語聲不
出者是也先用蘆汁加玄明粉或蜜湯探取其痰急服

荆防消毒散牙間腫處紫黑用小刀点破即用冰片敷吹之無不効驗

○或蓮花重舌者具蘊熱乘風而發心火炎上之義治法同前

○或病人瘡後口中臭腹中絞痛者何皆因熱毒積於脾家急用蘇子降氣湯服之

蘇子

前胡

厚朴

甘草

陳皮

半夏

黃芪

人參

五加皮

乾薑

肉桂

桔梗

當歸

菴活

麥門冬

連翹

○或病人瘥後喉中乾痛者何皆腎水枯涸心火衝上耗散津液先用麥門冬五味人參杏仁天門冬甘草天花粉生地當歸桔梗山梔仁之類噙以雙清丸

薄荷

杏仁

桔梗

玄參

砂仁

甘草

右煉蜜丸

○或病人瘥後氣短及聲不出者皆肺氣不行降氣湯多加前蒡臨服加薑汁以佐之若病後聲啞不言此乃肺經受刑百無一生

○或風熱喉閉內外俱腫者謂其人久積熱毒因而感風
風熱相搏發山外來則壅喉間其人面赤腮腫身發寒
熱喉中有塊如拳外血鮮紅先用玉字藥蜜調点之次
用荊防消毒飲加減治之

○或牙關緊強不得開者此皆風痰相搏壅塞咽喉先用
木針排開或黃蘗菜汁或溫蜜湯或醋水俱下玄明粉
灌喉再用鷺翎攪之吐出痰涎幾碗外用五倍末醋調
敷之急服荊防二陳湯口吹冰片散

○或喉中有瘡其色帶黃探痰同前用小刀点瘡上出膿

後即吹冰片散宜用服鼠粘子解毒湯

○或風熱喉閉其因皆由病人久積熱毒因而感風風熱相搏故爾發外治法同前

○或虛陽上攻由於久病元氣虛弱邪火上行咽喉腫痛上下不升降水火不既濟心火衝喉故腫痛而閉塞其形若何語聲不出牙關緊急痰涎滿口手足厥冷頭目昏眩者是也治法如前

○或厥重不省人事目張直視可用茱萸研爛醋調塗脚心然後用降氣湯治之氣喘加前胡烏藥氣短加沉香

人參待手足溫飲薄粥以斂元氣入穀則呂絕穀則亡此之謂也

○或腮頰浮腫外面赤者此必感於風毒急用紫蘇楓葉相枝煎湯洗之外用荊防羌活湯以祛其風或十宣散○或病人手足厥冷口唇搖動者宜用小續命湯薑棗煎熱服

○或病傳右畔者餘毒未除急服牛旁子湯降氣湯加減治之

○或舌上有白胎結硬必作木舌用前法治之

三才圖會卷一
二
○或舌下生小舌名重舌况舌乃心之苗心火炎上故生
之用小刀点紫黑處吹冰片散服井桔湯加山梔仁連
翹之属

○或病後夜間不得睡津液少者杏蘇膏或人參酸棗仁
湯治之

○或虛陽上攻上下不升降水火不既濟腰冷不知痛癢
口中痰效唇黑者不治

○或前証口中紅活吐得血又有痰涎息而青者不治
○或前証手足冷者聲音不響喉中無腫乾痛者不治

○或前証手足冷不能自收頸低不能自舉眼暈暗者不治

○或舌捲大不得吞嚥皆由熱毒衝上急用紫雪加腦麝
搽舌上再用冰片散吹之

○或咽喉有腫復生重舌此兩經受病俱有邪也心邪發
於舌下謂邪出於喉嚨蓋因喉間之邪觸起於心經之
邪則其病俱發外症頭疼項強身發潮熱者是也探痰
法同前再甲紫雪冰片散等治之

○或舌症白胎堅硬藥味不得入者揩拭紫雪用竹片刮

舌然後用藥

○或熱毒攻於舌則舌生瘡客風吹乾津液則舌硬也王叔和云三部俱數心家熱舌上生瘡唇破裂治法同前
○或上腭生瘡其因乃上焦積熱脾之氣行也然上腭屬脾故脾經受熱則上腭生瘡也務須服清上膈去風痰之劑

○或咽喉有腫兼舌上生瘡以心經受熱也邪熱存心日久則為喉閉餘毒干心則舌生瘡也須用冰片散玄參升麻湯加減治之其形如楊梅故謂之重舌

或酒毒喉閉酒毒蒸於心脾二經則壅咽喉其人面赤而眼睛上視者是也取痰法如前再用水片散吹之清涼散飲之

○或口中卒然有腫轉脹轉大此名飛瘍也漸至殺人用小刀点出血鼠粘子解毒加紅花牡丹皮惡心腹脹滿者難生

○大凡男婦治法一般惟女人喉中有腫而色紅者此月經不調也經不能行則壅塞於上故咽腫痛也蓋由榮衛不和但男子以氣為主女人以血為主男婦各隨其

氣血之分調治宜調榮湯可也如病勢重其色微白脚
冷者此虛陽上攻宜服降氣湯探痰吹藥同前婦人有
孕心頭痛者不治

○或牙關緊強不得開心頭悶亂氣絕者可用皂角末吹
喉中

○或婦人產前咽喉痛而脉浮者不治

面赤而目睛上視者不治

面黑頭汗出者不治

心胸緊滿吐痰不出者勿治

自利不治

氣促四肢厥冷勿治

心中怔忡胸膈前紅甚舌捲面赤目上視者不治

血氣攻心欲絕面紅勿治

自利喘不治

手足厥冷不治

潮熱往來時發譫語不治

胸腹脹急不治

喉中或雷聲或搶食不治

○或婦人傷寒身發潮熱咽痛者此經行上也活人書云
婦人傷寒經水適來晝則明明暮則譫語如見鬼神狀

此乃熱入血室無犯胃氣及上二焦不可下也小柴胡湯主之今咽喉痛而潮熱往來面赤唇紅者此熱邪上壅也不用小柴胡湯宜用竹葉石膏湯清上膈除心煩所以為妙次用四物湯

○或傷寒病四五日發熱鼻乾口燥咽喉者陽明白病也陽明屬胃汗多則胃汁乾故津液不能潮咽而乾痛也宜用人參敗毒散主之

○或傷寒三五日咽喉中有腫其色鮮紅痰涎自出頭痛項強須知屬太陽經邪氣入於經絡觸動心間但積熱

之毒攻咽則咽喉腫痛其桔湯內加牛旁子玄參生連
之味吹藥同前

○或傷寒八九日已上身無潮熱腹痛自利而咽喉痛者
此太陽經受病也傷寒得汗已不解轉入太陰腹滿時
痛自利而咽喉腫痛其色微白此症可治如手足厥冷
自利不止者用真武湯主之所謂真武者能補下元助
陽正氣以手足和煖為妙經云但要口中紅活有痰可
治宜隨症加減用藥若口中黑則血已枯乾聲啞目上
視汗出者不能治矣切宜仔細看症

○或傷寒八九日已上得汗已不散喉嚨痛舌乾唇燥者此少陰經自病也太陰經受病得汗後未解傳入少陰經少陰屬胃汗多則腎汁乾其腎水不能潮潤咽喉故其病也如自利腹中痛手足厥冷咽中腫痛不可吞嚥如無涎唾及舌上乾者不治

○或病人八九日已上身微溫無他症但喉中痛而無腫聲啞者不治

○或傷寒十餘日已上得汗已病解無潮熱脈平靜而咽喉痛者此餘毒上攻也宜用粘子解毒湯

○或陰毒傷寒身體重背強眼痛不堪任小腹急痛口青
黑毒氣沖心四肢厥冷惡心吐逆咽喉不利肢沉細者
能速灸臍輪下六目之內全愈否則難生

○若傷寒十餘日已上病後煩滿咽喉痛舌捲而咽縮者
不治

○若十餘日已上病不解傳變咽喉痛外症唇青舌捲者
此病屬厥陰經受病也難治

咽喉乾痛無痰不治

咽喉痛而唇捲不治

咽喉痛而頭汗出不治

口中黑者難治

鼻中塞者不治

○或口中乾夜間潮熱不得睡卧時發譫語舉足妄動者
用十味人參散主之

一地松汁亦妙

一谷精草礮末吹之


一小青草汁亦妙

一雄黃女明粉白礬為末吹之吐痰

夢麟校正

急喉圖


雙乳蛾



左咽軟主吞嚥
咽門分兩路其受病不同
右喉主出聲


經云喉能厚氣咽能嚥物故喉中病總而言之故為之
咽喉醫者可別而治之其症種種各類其狀各各不同
切宜仔細詳審此即雙乳蛾也

單乳蛾



左畔虛陽上攻其腫微紅者若肺氣外症
手足厥冷痰涎自出頭重目昏急用藿菜
酸汁加玄明粉灌之旋去痰涎即吹冰片
散再服蘇子降氣湯二陳湯并桔湯如厥
重不省人事氣欲絕者急以茱萸研爛酸
醋調塗脚心

風熱喉症




此症之起由于憂思勞碌太過或對風
言語風入肺經作痰務多去痰為要其
色鮮紅久而紫赤急用小鋒刀點之或
用芦刀點之血微出火已瀉矣再服煎
劑并冰片散吹之甚効凡紫赤色者變
成淡紅色愈之漸也

牙 疳




牙邊生疳者如豆大此脾胃二經火也
宜用小刀点破之搽以冰片散再服清
胃湯甘桔湯無不愈矣

舌微黃




右畔虛陽上攻其色微黃其形若奄
謂之乳蛾其症亦手足厥冷治法同前
倘腰痛加乾薑赤芍藥

酒 毒 喉 痺




其形若雞子其腫鮮紅其光如鏡外症發
熱惡寒頭痛頸強此上焦積熱心脾受之
蓋心脾二經主上焦宜服精子解毒湯治
法同前

風毒喉痺




外赤腫內腫微紅帶白色其形似蒸餅連
腮腫痛外症身惡寒而無熱腮領浮腫牙
關緊強此乃風痰相搏結塞喉間治法必
以去痰為要吹藥吹之若外面腫紅用圖
藥敷之中留一大孔再潤之以助藥力

風熱喉痺



其腫紅而微紫其形如拳其人面赤而目
上視外症壯熱惡寒儼若傷寒此病人久
積熱毒因而感風所致如病人聲音不響
宜用潤肺之藥治之


上 脘 生 瘡



上脘生瘡如黃粟口中腥臭外症為手伯
冷脚怯寒此脾經受熱則上脘為脾氣
通於口故脾經受熱則上脘生瘡也先用
蚌水布蘸繳淨患處先服清脾降火湯再
吹冰片散無不効又宜戒酒戒色

○ 附取蚌水法用蚌洗淨打碎取水另用濕
綿布濾清若用夏布則夏布孔遇水即疎
滑則蚌中馬蝗虫竟在水碗矣偶入口中
將何處之其綿布孔遇水即緊密則蝗不

又酒毒喉痺圖



能下故用之口喉之症屬太陽之火然蚌乃河中之物屬太陰之精故借水以濟火耳


其腫黃其血黑其形若臂其腫若坎外症面赤目睛上視此乃熱毒傷於心脾氣通於口循環上下故咽喉痛治法先取其痰次用冰片散乾吹鼠粘子湯多加乾薑天花粉生黃連山梔仁連翹玄參桔梗枳殼

重舌症




其舌下生一小舌其舌鮮紅其外症頰下
浮腫有硬核此心經受熱毒氣出於舌下
先用紫雪摻上流出熱涎急服井桔湯加
薑燈心煎服

重 勝 症



舌上生一瘡其狀若楊梅外症無寒並熱
但作事煩心先以甘草湯斂加山梔後服
黃連解毒湯再吹冰片散不宜用刀

口瘡




舌生瘡如黃粟外症快寒而口張先用蚌
水或田螺水或苦茶繳淨然後搽藥次服
鼠粘子解毒湯加山梔黃連口臭冰片吹
藥內加人中白枯礬銅青黃連末

蓮花舌



舌下生三小舌其類如蓮花狀但舌乃心
之苗心火上炎或思慮太過或火氣所傷
或酒後當風取涼以致風痰相搏而成此
症急用清涼解毒湯加減服之再吹冰片
散如腫不散次用小刀針出紫血為妙

陰毒喉痺




腫如紫李見黑色其色光血紅可治○陰
毒血黑不治外症惡寒其身關動振腰痛
脚冷此冬月感陰濕火邪相干也其血微
紅及腫處軟喉中有痰可治血紅黑甚腫
硬喉乾難治先服五福化毒丹次以蘇子
降氣湯再吹冰片散一月之內戒酒

纏喉風外症




此症外面症如蛇纏頸身發潮熱頭目大
痛其症其腫紫糖色依總論治之前吹藥
內加雄黃腦麝服荊防粘子二陳湯急用
鷺毛蘸燈窩濁油攪去痰涎三四碗方活
如痰不能去難生矣須要避風

積熱喉癰




其腫如黃糖李微黃上面紅絲外症頂上
痛齒疼此胃經受熱胃氣通於喉嚨故患
喉癰探痰法同前吹藥冰片散加玄明粉
煎藥加當歸黃芪倍片芩

木舌症




其木舌硬如穿山甲見人舌做一拳外症
增寒壯熱語言蹇澁此心經受熱也心有
舌之本因心而病治法以小刀點紫黑處
煎藥內多加山梔山梔瀉火之要品也

纏喉風內症



其腫紅線白色腫塞不見咽下外症身發
寒熱頭痛

才 虛



此症齒屬腎經或風乘虛而入發腫或飲
酒太過而腫或血虛而腫或剔傷而腫或
房勞陰虛而腫治法皆以意詳症消息而
治

川烏

藥本

獨活

荆芥

香附

當歸

皂角

細辛

川椒

水醋各半煎乘熱噙嗽另服清胃湯王池散

亞瘴喉風



此啞瘡者風痰犯於咽膈之間以此口不能言牙關不開急用蟾酥磨水滴入鼻孔即開隨用桐油滴入喉中仍將鷺毛攪喉間風痰出盡再用甘草湯鮮桐油之氣即用冰片散吹之更服荊防敗毒散連進三服

如若面紫舌青唇黑鼻流冷涕爪甲俱青目中多淚不可治

弄舌喉風



此症啞不能言舌出常將手拏急將兩手大指側爪甲縫用三稜針每指刺三針有血可治無血不治若針少商穴亦妙用銅匙排開口用胆硝丹吹入喉中燈窩內油脚再用鷲翎蘸攪出痰涎仍服雄黃化毒丸七九茶清送下後服疎風甘桔湯再用冰片散頻吹之其方具後

當歸稍

枳殼

桔梗

茯苓

黃芩

人參

山梔

黃連

荊芥

防風

玄參

甘草

連翹

縮砂

天花粉

陳皮

乾葛

川芎

水二鍾煎服

吹藥名冰片散

冰片

一錢真者

朋砂

五錢

雄黃

二錢

蜜炙栢

細末二錢

鈔三張

煨灰

鹿角霜

二兩

枯礬

錢

粉草末

一錢

靛花

二錢

黃連末

二錢

玄明粉

二錢

雞內金

能存性錢即雞內金

口中氣臭加人中白

煨三錢

銅青

煨至過五分

紫雪

青礬

不拘多少火煨通紅取出放地上出火毒

冰片

麝香

各許

硃砂

玄明粉

右為末放舌下或喉間

一字散

用明礬一兩火上熬滾隨下巴莖仁廿一粒即取出待冷取出巴莖仁研末乾吹名曰玉鑰匙

杏酥膏

甘草

二錢

硃砂

二錢

桔梗

二錢

明砂

二錢

麝香

少許

白芍藥

杏仁

三錢黃芩

俱為末

右煉蜜丸噙化

化毒丹

人參

二錢

茯苓

五錢

靛花

五錢半
為末

麝香

無亦可

玄參

二兩

桔梗

二兩

甘草

一兩二錢

薄荷

一兩二錢

牙硝

五錢

右為末蜜丸

十味人參散

人參

茯苓

甘草

當歸

桔梗

紫蘇

羌活

白附子

天花粉

黃芩

薑棗煎

烏藥順氣散

烏藥

沉香

人參

枳殼

陳皮

甘草

薑煎服

蘇子降氣湯

前胡

蘇子

薑

半夏

黃芩并洗

陳皮

肉桂

分

厚朴

甘草

桔梗

黃芩

防風

枳殼

煎至一斗

薑三片煎服

清火降氣湯 治雙乳鵝

蘇子

如牙

前胡

厚朴

甘草

陳皮

半夏

用陳皮為湯

黃芪

人參

五加皮

乾薑

肉桂

桔梗

當歸

羌活

天花粉

玄參

二陳湯

陳皮

半夏

茯苓

甘草

玄參

升麻

桔梗

天花粉

牛蒡子研

連翹

當歸

生地黃

赤芍藥

黃連

白朮

黃芩

青皮

紫蘇梗

山梔仁

甘桔湯

甘草

二錢

桔梗

二錢

花粉

一錢

鼠粘子一錢

連翹

山梔仁

一錢

生黃連一錢

生地黃一錢

鼠粘子解毒湯

鼠粘子

甘草

升麻

生地黃

天花粉

連翹

白朮

黃芩

黃連

山梔仁

桔梗

青皮

防風

玄參

清脾降火湯

牡丹皮

青皮

當歸

生地黃

黃連

黃芩

桔梗

白芍藥

薄荷

防風

茯苓

白朮

澤瀉

猪苓

山梔仁

麥門冬

玄參

八正散

大黃

瞿麥

木通

甘草

滑石

車前子

山梔

篇蓄

黃連解毒湯

黃連

鼠粘子

桔梗

天花粉

連翹

當歸

生地黄

白芍藥

牡丹皮

青皮

枳殼

前胡

小柴胡

乾葛

玄參

金銀花

雄黃解毒丸

雄黃

一兩水飛

鬱金

一兩如無
鬱金者用黃連

甘草節

一兩

巴豆仁

三十粒

桑葉粉

一兩

右為末醋糊為丸豆大每七丸茶清下吐出痰涎立停
未吐再服七丸如人死者心尚熱研末灌之

牛黃清心丸

牛胆南星

二兩麝香

五分

珍珠

五分

冰片

五分

黃連末

二錢

防風末

一錢

荆芥末

一錢

五倍末

一錢

桔梗末

一錢

玄參

一錢

扶神

一錢

當歸

一錢

雄黃

二錢

輕粉

三分

天竺黃

一錢

犀角末

一錢

右為細末和勻甘草膏為丸如龍眼大辰砂為衣日中
晒乾入磁瓶中塞緊瓶口勿令出氣臨服用薄可湯磨
服一丸

圖藥名鐵箍散

多年陳小粉炒黑

四兩

五倍子末

二兩

龜板

火煨兩

右三味為細末醋蜜調敷常用餘醋潤之以助藥力
又方名善消散

白芨

二兩五錢

雄黃

五錢另末

大黃

八錢

黃栢

五錢

山茨菇

五錢

右為末蒸一把搗爛加蜜少許再搗取汁調勻搽四向
空中出毒氣如前潤之

王樞丹 即紫金錠

五倍

三兩淡紅黃色者搗碎淨

山茨菇

二兩 麝香

錢真

續隨子

去殼研細以紙包壓去油兩

紅芽大戟

洗淨二兩

右各另末和勻旋下糯米粥在木杓中搗千餘下分作
四十錠於端陽重陽七夕脩合辰日亦可焚香在淨室
中勿令婦人孝服不完形人及鷄犬之類見之須要至
誠否則無効日中曬乾貯瓶中塞口勿令出味如遇喉

閉癰疽疔瘡蛇咬水磨服之全患處尤妙

萬靈丹

木香

乳香

沒藥

三錢

血竭

二錢

蟾酥

五錢

紫石英

雄黃

二錢

犀角

一錢

冰片

五分

麝香

一錢

右為細末糯米粥和勻搗千下成條每條五分如遇前症以津液磨搽水亦可

追疔飛龍奪命丹

辰砂

雄黃

蟾酥

蜈蚣

炙

枯礬

金砂

輕粉

二分

麝香

五分

冰片

二分

右為末 蜚螬搗膏為丸如豆大 辰砂為衣如遇疥瘡惡症用葱白二根同此丹五丸嚼爛熱酒送下以衣覆患處出汗為妙其酒隨量飲之

大小人口內臭疳藥

枯礬

假極高
三錢

人中白

即多年馬桶內尿積錢火煅雞內金炙錢

銅青

一錢

麝香

二分

冰片

一分

阿魏

一分

右為末先用米泔繳淨患處將此藥乾吹蚌水繳尤妙
平舌藥法

一人舌長三寸不能入口用芭豈仁三粒用竹紙包打去豈仁將此油紙撚成条火點薰之其舌聞烟即時縮上急服清脾降火湯再吹冰片散

完舌圍藥

一人無故舌縮不能言用芥菜子碾末醋調敷頸項下即時能言服清脾降火等湯再用紫雪冰片散吹之又一人舌忽脹大滿口以百草霜搽之即服粘子鮮毒湯多加黃連連翹紫蘓梗或服黃連鮮毒湯併服牛黃清心丸如無百草霜以冰片散代之用銚刀刺之

喉腫



此毒起於脾經因食煎燂油膩等物及飲酒太過而行房事以致毒氣不能流行聚結於喉根若不速治潰毒閉急即死治法先用醋水蘸汁攪去痰涎即用吹喉藥吹數次後服八正順氣散

厚朴

砂仁

半夏

陳皮

茯苓

青皮

桔梗

芍藥

枳殼

木香

玄參

犀角

山梔仁

右剉水三鍾薑三片煎服

喉節



此症生於鳩尾之中初起如梅核在喉膈之間吐不出咽不下至三日漸上喉節之間名為喉節其疾須用刺破後用膽硝丹吹入喉中再用雄黃化毒丸吞下七丸仍用四七氣湯連進五服再用冰片散吹之

四七氣湯

甘草

桔梗

枳殼

天花粉

鼠粘子

山梔仁

生地黃

玄參

陳皮

連翹

茯苓

紫蘇

右咬咀水二鍾薑三片煎服

纏猴風



此病因腎經有熱內枯不能上潤致令心火盛故發此症服敗毒散具探吐法在前

羌活

防風

桔梗

黃芪

黃芩

白芷

甘草

陳皮

柴胡

芍藥

前胡

鼠粘子

玄參

仍用吹喉藥吹三五次又用白地松根醋搗汁漱出風痰如喉間雷響者不可治切宜仔細

氣癰喉閉



此症為因聚毒寒於喉間痰涎稠實發寒熱者仍分上中下三關毒在下關者難治上中二關用吹喉藥吹數次茶湯送下雄黃化毒丸七丸然後服參苓順氣散

人參

茯苓

烏藥

蒼朮

吳蘇

白朮

粉草

陳皮

氣粘子

枳殼

玄參

山梔仁

杜根

天花粉

哈食喉風



此症因熱毒在於心經咽喉燥而無痰若噎食者不可
治用川桔散

川芎

防風

桔梗

鼠粘子

山梔仁

白芷

玄參

天花粉

枳殼

黃芩

烏藥

甘草

陳皮

連鬚葱一根燈心七寸同煎至七分食後服如落心肺
間刺痛者仍用當歸連翹散加大黃利下如久不治變
為飛絲勞毒能傷人命

喉鴉



此毒因喜怒憂思悲恐驚以傷七情鬱結成癰毒生喉
間若不速治恐毒氣內攻喉骨若出必致口內出膿雖
不傷命即成冷痿終身之痼疾也治方於後

十音散

治喉節初起有膿即散破用內補散外用金絲膏貼之
吹藥同前

腳根喉風



此症脚根發起至於喉間或一年發一次半年發一次
切忌熱物不得傷於怒氣其病一日行一穴至七日行
七穴雖然不妨只是要發用吹喉藥仍服敗毒散如腥
惡發泡者死

侯明



此症因外感寒邪內傷熱物或大寒後便入熱湯洗故
將寒氣逼入脾經冷氣阻於中脘邪氣熱客於心經故
生此疾急用三稜針刺手腕中紫筋上或少商穴出血
却將雄黃化毒丸冷茶磨化灌之仍將冰片散吹入喉
中待漱出風涎稠痰為愈更服八正順氣散

陳皮

砂仁

枳殼

桔梗

半夏

當歸

川芎

人參

鼠粘子

玄參

白芍藥

水二鍾煎八分後服玉樞丹

喉痛



喉癰生於喉間兩傍或單或雙形如圓眼大血絲相裹
如瘤故名之此症肺經受熱多語損氣或怒中高喊或
誦讀太急或多飲燒醞酒或多噉炙煖物犯之即痛不
犯不痛須要斂神晏息以藥攻之則此症脫落矣不可
用刀點破

益氣疏風湯

升麻

甘草

當歸

川芎

生地黃

白芍藥

桔梗

天花粉

黃芩

麥門冬

前胡

青皮

乾葛

紫蘓

連翹

白茯苓

防風

麝香散 日夜吹之

真麝香二錢

冰片

三分

黃連末錢

右研末和勻蘆管吹入患處一日夜五六次

又一人口内生肉毬有根線長五寸餘吐毬出方可飲
食以手輕捻痛徹至心煎劑同前再用真麝香二錢
分二次水調服之或用麝香散三日根化而愈
又一人咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起有孔出臭

氣用臭狗橋葉煎頻服之而愈

一人舌上忽出血如簪孔赤小豆一升杵碎水三碗
和搗取汁每服一盞不拘時服槐花末搽上尤良
一人齒齦邊津液血不止苦竹茹四兩醋煮含嗽吐之

縣志



此毒生於上齟形如紫李墜下抵舌其人口不能言舌不能伸頭不能低仰面而立鼻中時出紅涕若不速治毒入於腦即死治方於後

用銅匙挑開口竹批針破癰頭用鹽湯攪淨血出盡用水片散吹入患處閉口以待藥化自然嚥下連吹三五次仍服荊防敗毒散再服雄黃化毒丸三丸冷茶清下此症形雖註外其實生口中

鎖匙瘡



鎖喉瘡者心經毒氣小腸邪風發於聰會之端注於懸
膺之側初生如瘰癧不能飲食閉塞難通漸次腫破化
膿早治得生宜服當歸連翹散之類內用冰片散牛黃
清心丸之類治之

蛇蟻不拘以麝香冰片和搗搽之

傷寒喉閉



此症傷寒遺毒不散致八九日後喉閉皆因熱毒入於
心經脾經急服四七氣湯二三貼次用冰片散後服蠲
毒流氣飲

白芷

防風

陳皮

連翹

人參

香附

川芎

當歸

玄參

天花粉

枳殼

甘草

桔梗

小柴胡

鼠粘子

山梔仁

一人傷寒舌出寸餘連日不收用梅花冰片搽舌上
即收重者用五錢而愈

雙蛾風



此症有兩枚在喉間兩邊如豆大急將黃蘗汁蜜少許
玄明粉漱出風痰仍服當歸連翹散雄黃化毒丸七丸
茶清送下次用冰片散吹入數次立効後服當歸連翹
散

當歸

生地黃

連翹

前胡

甘草

枳殼

桔梗

黃芩

鼠粘子

玄參

天花粉

白芍藥

水二鍾燈心煎服

口駭



一名月關瘡

一名鴈來風

一名虫蝕瘡

此症急用馬齒莧汁洗緊唇仍用黃蘗汁灌去風痰再用米屑散吹之然後服防風通聖散

防風

大黃

朴硝

川芎

甘草

當歸

黃芩

滑石

石膏

薄荷

山梔

麻黃

荊芥

桔梗

白朮

連翹

如毒氣歸心胸前脹滿上氣頻促下部洞泄不止必是難治

水舌乳蛾



此症為因心經熱毒或因酒後溫牀厚被以致熱氣攻
於心經故生單蛾及舌脹而紫吐出血痰急用三稜針
刺舌下金津玉液二穴及刺乳蛾俱破出血痰却用胆
硝丹吹入喉中仍用荊防敗毒散雄黃化毒丸用茶湯
清送下吹藥同前

一婦人木舌脹滿口諸藥罔効以銚針砭之五七次腫
減三日方平血出盈斗服藥同前

宋寶太師瘡瘍經驗全書卷之一畢